Gruppentheorie

Themenüberblick

1. Definition einer Gruppe
2. Homomorphismen
3. Gruppenoperationen
4. Direktes Produkt
5. Semidirektes Produkt

1. Definition einer Gruppe

Definition Gruppe

Sei G eine Menge und $*$ eine Verknüpfung

$$\begin{aligned} * &: G \times G \rightarrow G \\ (a, b) &\mapsto a * b \end{aligned}$$

$(G, *)$ ist eine Gruppe, wenn folgende Axiome gelten:

- Assoziativität $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in G$
- Neutrales Element $e \in G$ mit $a * e = e * a = a$
- Inverse Elemente $a \in G \Rightarrow a^{-1} \in G$ mit $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Gruppe (Beispiel)

$(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Gruppe.

Sei $\mathbb{Z}$ eine Menge und $+$ eine Verknüpfung

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$
$$(a, b) \mapsto a + b$$

$(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Gruppe, wenn folgende Axiome gelten:

- Assoziativität $(a + b) + c = a + (b + c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$
- Neutrales Element $0 \in \mathbb{Z}$ mit $a + 0 = 0 + a = a$
- Inverse Elemente $a \in \mathbb{Z} \Rightarrow -a \in \mathbb{Z}$ mit $a + (-a) = (-a) + a = 0$

2. Homomorphismen

Definition Homomorphismus

Seien $(G, *)$ und $(H, \star)$ Gruppen. Eine Funktion $f: G \rightarrow H$ heißt **Gruppenhomomorphismus**, wenn für alle $a, b \in G$ gilt:

$$f(a * b) = f(a) \star f(b)$$

Gruppenhomomorphismus (Beispiel)

Gruppen: $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2 \cdot \mathbb{Z}, +)$.

$$f(a + b) = f(a) + f(b)$$

$f: \mathbb{Z} \rightarrow 2 \cdot \mathbb{Z}$ ist ein Gruppenhomomorphismus.
 $x \mapsto x + x$

$$f(a + b) = (a + b) + (a + b) = (a + a) + (b + b) = f(a) + f(b)$$

Gruppenhomomorphismus (Beispiel)

$$(\mathbb{R}^+, \cdot)$$

$$(\mathbb{R}, +)$$

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log(x)$$

$$f(a \cdot b) = f(a) + f(b)$$

$$f(a \cdot b) = \log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b) = f(a) + f(b)$$

$\Rightarrow f$ ist ein Gruppenhomomorphismus

injektiv, surjektiv, bijektiv

- Eine Funktion f heißt **injektiv**, wenn für jedes Bild höchstens ein Urbild existiert.
- Eine Funktion f heißt **surjektiv**, wenn für jedes Bild mindestens ein Urbild existiert.
- Eine Funktion f heißt **bijektiv**, wenn für jedes Bild genau ein Urbild existiert.

injektiv, surjektiv, bijektiv

injektiv

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f(x) = 2x$$

surjektiv

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

$$f(x) = \sin(x)$$

bijektiv

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f(x) = x + 3$$

Spezielle Homomorphismen

Sei $f : G \rightarrow H$ ein Gruppenhomomorphismus.

- ♦ Monomorphismus: f injektiv
- ♦ Epimorphismus: f surjektiv
- ♦ Isomorphismus: f bijektiv
- ♦ Endomorphismus: $G = H$
- ♦ Automorphismus: $G = H, f$ bijektiv

Isomorphie

- Zwei Gruppen G, H heißen **isomorph zueinander**, wenn es einen Isomorphismus $f: G \rightarrow H$ gibt.

Schreibweise: $G \cong H$

- Zwei isomorphe Gruppen haben immer gleich viele Elemente (da f bijektiv ist).
- Zwei isomorphe Gruppen sind bis auf die Bezeichnung der Elemente identisch.

Isomorphie (Beispiel)

$$G_1 = (V, \circ)$$

$$V := \{1, a, b, ab\}$$

1 ändert nichts (neutral)

a vertauscht Seite 1 und 2

b vertauscht Seite 3 und 4

ab vertauscht Seite 1 und 2
sowie Seite 3 und 4

$$G_2 = (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$$

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

$$f: V \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

$$1 \mapsto (0, 0)$$

$$a \mapsto (0, 1)$$

$$b \mapsto (1, 0)$$

$$ab \mapsto (1, 1)$$

f ist ein Isomorphismus

$$\Rightarrow V \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

3. Gruppenoperationen

Gruppenoperationen

- Mengen haben keine Verknüpfung
- Rechenoperationen also zunächst nicht möglich
- Idee: Operationen auf einer Menge von einer Gruppe durchführen

Motivation

- Menge = { A, B, C }
- Ziel: „Rechnen“ mit den Punkten

- Eine Möglichkeit dazu wäre:
Bewegen im Uhrzeigersinn

• $A + 0 = A$	$A + 1 = B$	$A + 2 = C$	$A + 3 = A$	...
• $B + 0 = B$	$B + 1 = C$	$B + 2 = A$	$B + 3 = B$	...
• $C + 0 = C$	$C + 1 = A$	$C + 2 = B$	$C + 3 = C$	...

- $\mathbb{Z}_3$ wäre also als Gruppe geeignet

Definition Gruppenoperation

Sei X eine Menge und $(G, *)$ eine Gruppe.

Eine Operation von G auf X ist eine Funktion

$$\begin{aligned} \tilde{\rho} : G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto \tilde{\rho}(g, x) := g.x \end{aligned}$$

mit den Eigenschaften:

- (1) $e.x = x \quad \forall x \in X \quad e = \text{neutr. Elem. in } G$
- (2) $g_1.(g_2.x) = (g_1 * g_2).x \quad \forall x \in X \quad \forall g_1, g_2 \in G$

Definition Gruppenoperation

Andere Notation:

$$\rho : G \rightarrow \{ f : X \rightarrow X \mid f \text{ ist ein Automorphismus} \}$$

$$g \mapsto \rho_g : X \rightarrow X \\ x \mapsto g.x$$

- ρ ist ein Gruppenhomomorphismus
- $\rho_g^{-1} = \rho_{g^{-1}}$

Gruppenoperation (Beispiel)

Sei $X = \{ A, B, C \}$ und $G = (\mathbb{Z}_3, +)$.

$\tilde{\rho} : G \times X \rightarrow X$

$(g, x) \mapsto g$ Schritte im Uhrzeigersinn ab $x := g.x$

Offensichtlich gilt:

$$(1) \quad 0.x = x \quad \forall x \in X$$

$$(2) \quad g_1.(g_2.x) = (g_1 + g_2).x \quad \forall x \in X \quad \forall g_1, g_2 \in G$$

Danke für die Aufmerksamkeit!